

TAMMEX FAMILY

1. Identifikácia, zloženie a účel zdravotníckej pomôcky

1.1 Opis a návod na použitie

TAMMEX FAMILY je jednorazová zdravotnícka pomôcka v prášku na okamžitú prípravu orálnej suspenzie určenej na perorálnu liečbu akútnej hnačky a bolestivých symptómov súvisiacich s poruchami tráviaceho traktu.

1.2 Mechanizmus účinku

Diosmektit je prírodný íl vyznačujúci sa štruktúrou z jemných, prekrývajúcich sa kryštalicích lamiel s vysokou absorpčnou schopnosťou, ktoré pohlcujú tekutiny z čreva, zvyšujú konzistenciu stolice a spomaľujú vyprázdňovanie. Absorpčná schopnosť diosmektitu umožňuje aj reakciu prípravku TAMMEX FAMILY s glykoproteínmi v sliznici pokrývajúcej gastroduodenálnu stenu, ktorá zmení ich fyzikálne vlastnosti tak, aby sa vytvoril ochranný gél proti hypersekrecii kyseliny a proti látkam narúšajúcim žalúdočnú stenu.

2. Zloženie

Jedno vrecúško TAMMEX FAMILY obsahuje:

Diosmektit 3 g

Pomocné látky: pomarančová aróma, kyselina citrónová, oxid kremičitý, acesulfam K, sukralóza

3. Veľkosť balenia

Balenie obsahuje desať 3,25 gramových vrecúšok na jedno použitie.

4. Návod na použitie

Dospelí: 1 vrecúško na 100 ml tekutiny, 3-krát denne.

Deti > 6 rokov veku: 2 – 3 vrecúška denne.

Deti > 1 rok: 1 – 2 vrecúška denne.

Každé vrecúško sa po otvorení musí použiť iba raz. Obsah každého vrecúška rozpustíte v pohári vody alebo inej tekutiny. Malým deťom môžete obsah vrecúška rozpustiť v dojčenskej fľaške v 50 ml vody, alebo zmiešať s iným nápojom a rozdeliť do 2 – 3 denných dávok. Prípravok TAMMEX FAMILY môžete rozpustiť aj v polotuhej potravine. Aby ste získali homogénnu suspenziu, nasypte prášok pomaly do tekutiny a dobre premiešajte. Prípravok TAMMEX FAMILY je vhodné konzumovať medzi jedlami. U detí a dojčiat musí byť liečba akútnej hnačky doplnená včasným podaním perorálneho rehydratačného roztoku, aby sa zabránilo dehydratácii.

V prípade nutnosti je vhodné, aby aj dospelí konzumovali perorálny rehydratačný roztok počas liečby prípravkom TAMMEX FAMILY, čím sa zabezpečí správna hydratácia organizmu.

5. Známe nežiaduce účinky

Nie sú známe žiadne vedľajšie účinky spojené s dlhodobým užívaním tohto prípravku. Pri predávkovaní sa môže objaviť zápcha. V prípade výskytu nežiaducich účinkov odlišných od tých, ktoré sú uvedené, obráťte sa na svojho lekára.

6. Varovania a bezpečnostné opatrenia

- Tento prípravok uchovávajte mimo dosahu detí.
 - Nepoužívajte dlhšie než 10 po sebe nasledujúcich dní. Pokiaľ príznaky pretrvávajú, poraďte sa so svojím lekárom.
 - Neužívajte prípravok TAMMEX FAMILY, keď ležíte.
 - Nepoužívajte tento prípravok po uplynutí doby použiteľnosti vyznačenej na škatuľke a vrecúšku.
 - Prípravok nepoužívajte, ak je obal poškodený.
 - Každé vrecúško je určené na jednorazové použitie a treba ho otvoriť až tesne pred použitím; nepoužívajte čiastočne spotrebované vrecúška, pretože takýto spôsob použitia môže predstavovať riziká, ako je neúčinnosť roztoku alebo kontaminácia prípravku.
 - Neprekračujte odporúčanú dávku, v prípade výskytu nežiaducich účinkov (zápcha, bolesti v črevách, plynatosť) prestaňte prípravok užívať a poraďte sa s lekárom.
 - V prípade výskytu neočakávaných nežiaducich účinkov odlišných od tých, ktoré sú uvedené, poraďte sa s lekárom.
 - Nepoužívajte v prípadoch žalúdočných alebo črevných lézií, chronickej zápchy, podráždenia alebo upchania čriev.
 - Neužívajte prípravok TAMMEX FAMILY, pokiaľ užívate iné prípravky alebo perorálne lieky; absorpčný účinok diosmektitu môže nepriaznivo ovplyvniť ich účinnosť.
- V prípade súčasného užívania iných liekov sa pred užívaním prípravku TAMMEX FAMILY poraďte so svojím lekárom.

7. Kontraindikácie a obmedzenie užívania

Neužívajte prípravok TAMMEX FAMILY, pokiaľ ste precitlivený na niektorú z jeho zložiek. Prosím, poraďte sa so svojím lekárom, ak ste tehotná alebo dojčíte.

8. Uchovávanie

Neužívajte prípravok TAMMEX FAMILY po uplynutí doby použiteľnosti vyznačenej na obale. Prípravok skladujte pri izbovej teplote (max. 25 °C), nevystavujte ho účinkom priameho zdroja svetla, tepla a nadmernej vlhkosti, zabráňte kontaktu s vodou. Dátum expirácie na obale sa vzťahuje na prípravok v neotvorenom obale a riadne skladovaný.

9. Likvidácia

Prípravok zlikvidujte v súlade s legislatívou, ktorá upravuje likvidáciu odpadov. Nevyhadzujte výrobok alebo jeho obal do prírody.



Cfpharma⁺

Unit 619B, IDA Industrial Estate
Northern Extension
Waterford, Ireland.

WALMARK®

Distribútor: Walmark, spol. s r.o., Na stanici 22
010 09 Žilina, Slovenská republika
Držiteľ licencie: DH – NORM s.r.o.



Posledná revízia: Jún 2013

PK 1006-02
CF 6961/L/01/SLO